

Casenfilus

LACTOBACILOS ACIDÓFILOS

COMPOSICIÓN

Cada sobre contiene: Lactobacilos acidófilos, 240 millones. Excipientes: Lactosa, 1,6 g. Sacarina sódica. Leche en polvo desnatada y Vainillina, c.s.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

CASENFILUS: Envase con 10 sobres de 2 g cada uno.

ACTIVIDAD

La alteración o desaparición de la flora acidófila intestinal normal, que ocurre en el curso de enfermedades gastroentéricas o durante el tratamiento con antibióticos se manifiesta por síntomas variados que responden a la reposición de la misma. Casenfilus restaura la flora intestinal porque contiene, en forma liofilizada, el elemento necesario: Lactobacilos acidófilos, huésped habitual del intestino humano.

TITULAR Y FABRICANTE

Casen Recordati, S.L. Autovía de Logroño, Km 13,300. 50180 UTEBO (Zaragoza)

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de los procesos diarreicos agudos o repentinos. Prevención y tratamiento de las diarreas producidas por la administración de antibióticos.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se conocen.

ADVERTENCIAS

No usar durante más de 2 días o con fiebre alta o en niños menores de 3 años sin consultar con el médico.

Embarazo: Si está Vd. embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Uso en niños: menos de 3 años, consultar a su médico.

Advertencia sobre excipientes. Este medicamento contiene 1,6 g de lactosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con problemas de absorción de glucosa o galactosa, galactosemia o insuficiencia en lactosa.

POSOLOGÍA

Adultos: de 6 a 9 sobres al día.

Niños: de 3 a 6 sobres al día.

NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN

El producto se mezclará, preferentemente, con pequeñas cantidades de leche o agua fría.

SOBREDOSIS Y SU TRATAMIENTO

No se ha descrito. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Conservar en frigorífico entre 2º y 8º C. No congelar.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

SIN RECETA MÉDICA