

## **DALGÉN® SPRAY**

*Fepradinol HCl*

Dalgén® presenta una actividad antiinflamatoria tópica de efecto rápido y sostenido, con acción preferente sobre procesos inflamatorios agudos y en fenómenos inflamatorios primarios de cualquier etiología. Actividad estabilizadora de la pared vascular, inhibiendo cualquier incremento de la permeabilidad capilar inducido por agentes nociceptivos.

### **COMPOSICIÓN (por 100 ml)**

Fepradinol HCl: 6 g

Excipientes: Alcohol bencílico, propilenglicol, esencia, etanol 96° c.s.

### **INDICACIONES**

Terapia percutánea de los procesos inflamatorios óseos, articulares o ligamentosos de traumatología en general, medicina deportiva o del trabajo. Contusiones, esguinces, tendinitis, distensiones ligamentosas o musculares, contracturas, tendinitis, bursitis, lumbalgias

### **POSOLOGÍA**

Situar el orificio de salida del Spray aproximadamente a 10 cm de distancia de la zona afectada y pulsar solamente las veces que sea necesario para que quede impregnada de producto. Habitualmente se recomiendan de 3 a 4 aplicaciones al día.

### **ADVERTENCIAS**

Exclusivamente uso tópico. No pulverizar en los ojos, mucosas ni piel erosionada o irritada (heridas, quemaduras, dermatitis etc.). No inhalar.

### **IMPORTANTE**

Se han eliminado los gases propelentes de esta especialidad. Esta eliminación supondrá la desaparición de la sensación de frío cuando se aplica el producto.

Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.

### **CONTRAINDICACIONES**

Antecedentes de hipersensibilidad alérgica al fepradinol.

### **INTERACCIONES**

No se han descrito hasta el momento interacciones con el uso de fepradinol.

### **EFECTOS SECUNDARIOS**

No se han descrito. En caso de hipersensibilidad puede aparecer una reacción en la piel, de tipo eritematoso, que desaparece al interrumpir el tratamiento.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

No se han descrito casos de intoxicación. En caso de intoxicación accidental (poco frecuente debido a la forma de presentación y administración), realizar lavado gástrico, oxigenoterapia y medidas terapéuticas sintomáticas.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica (91) 562 04 20.

## **PRESENTACION**

Solución spray, frasco con 75 ml.

Con receta médica.

No sobrepasar la fecha de caducidad.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Casen Recordati, S.L.  
Autovía de Logroño, km. 13,300  
50180 Utebo (Zaragoza)