

LOMEXIN Crema **Fenticonazol (DCI)**

COMPOSICION

100 g de crema contienen:

Fenticonazol (DCI) nitrato 2g.

Excipientes: propilenglicol, lanolina hidrogenada, aceite de almendras dulces, ésteres poliglicólicos de ácidos grasos, alcohol cetílico, monoestearato de metilo, edetato sódico, agua purificada c.s.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Tubo con 30 g de crema al 2%.

ACTIVIDAD

Antimicótico de uso tópico con amplio espectro y acción antibacteriana sobre microorganismos gram positivos

TITULAR Y FABRICANTE

TITULAR: Casen Recordati, S.L., Autovía de Logroño, km. 13,300. 50180 Utebo (Zaragoza)

FABRICANTE: RECORDATI S.p.A.

Via Matteo Civitali, 1. 20148 – Milán - Italia.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

LOMEXIN crema está indicado en el tratamiento local de vulvitis y balanitis producidas por Candida. También esta indicado como tratamiento complementario del cónyuge de mujeres infectadas.

CONTRAINDICACIONES

Esta especialidad está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad comprobada a los agentes antifúngicos imidazólicos o a cualquiera de los componentes de la especialidad.

PRECAUCIONES

En caso de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de organismos resistentes, se deberá interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Evitar el contacto con los ojos.

No se aconseja el uso de jabón con pH ácido ya que este pH promueve la multiplicación de la Candida.

INTERACCIONES

No se han descrito

ADVERTENCIAS

El uso de productos tópicos (de aplicación local), especialmente si es de forma prolongada, puede causar reacciones de sensibilización.

Embarazo y Lactancia

Dado que no existe experiencia de uso durante el embarazo y la lactancia Lomexin no debería ser utilizado en estos periodos, salvo que según criterio médico el beneficio para la paciente justifique los posibles riesgos.

Efectos sobre la capacidad de conducción

Lomexin no ejerce efecto alguno sobre la capacidad de conducción.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

LOMEXIN crema está indicada como complemento al tratamiento ginecológico con LOMEXIN óvulos en candidiasis vulvovaginal para el tratamiento local de las afecciones cutáneas en la vulva (vulvitis) así como en balanitis candidiásica del cónyuge.

Lomexin crema se utiliza en el tratamiento de piel imberbe, pliegues cutáneos y membranas mucosas. Deberá aplicarse con un ligero frotamiento sobre la lesión, procurando abarcar 1 cm (aproximadamente) de piel sana alrededor de la zona

afectada. La crema se aplicará después de haber lavado y secado la parte afectada, una vez al día preferentemente por la noche, o bien, en caso de infección grave 2 veces al día (mañana y noche). Las aplicaciones deberán efectuarse de forma regular hasta la completa curación de las lesiones (de 2 a 4 semanas).

SOBREDOSIS

Dada la baja concentración de principio activo y la vía de administración es muy poco probable que se produzca una intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

Fenticonazol, el único principio activo de esta especialidad, es generalmente bien tolerado cuando se aplica sobre la piel y las membranas mucosas. Sólo excepcionalmente se han observado reacciones eritematosas suaves y transitorias.

En caso de aparición de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de organismos resistentes, se aconseja interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

La absorción percutánea de Fenticonazol es insignificante, por lo tanto se pueden excluir las repercusiones de tipo sistémico en las condiciones de uso sugeridas. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

FECHA DE CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

LOMEXIN Ovulos 200 mg: estuche con 3 óvulos.

LOMEXIN Ovulos 600 mg: estuche con 1 óvulo.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: Enero 2001