

LOMEXIN Ovulos 200 mg **Fenticonazol (DCI)**

COMPOSICION

Por óvulo:

Fenticonazol nitrato (DCI) 200 mg

Excipientes: triglicérido de ácidos grasos saturados, dióxido de silicio coloidal, gelatina, glicerina, dióxido de titanio, etil p-hidroxi benzoato de sodio, propil p-hidroxi benzoato de sodio, c.s.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Estuche con 3 óvulos vaginales de 200 mg, en blister.

ACTIVIDAD

Antimicótico de uso ginecológico.

TITULAR Y FABRICANTE

TITULAR: Casen Recordati, S.L., Autovía de Logroño, km. 13,300. 50180 Utebo (Zaragoza)

FABRICANTE: RECORDATI S.p.A.

Via Matteo Civitali, 1. 20148 - MILANO Italia

INDICACIONES TERAPEUTICAS

Lomexin óvulos de 200 mg está indicado en candidiasis vulvovaginal.

CONTRAINDICACIONES

Esta especialidad está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad comprobada a los agentes antifúngicos imidazólicos o a cualquiera de los componentes de la especialidad.

PRECAUCIONES

En caso de una vulvitis concomitante o una balanitis candidiásica del cónyuge, así como para evitar la reinfección, se deberá practicar en ambos un tratamiento local adicional con LOMEXIN crema.

En caso de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de organismos resistentes, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Se recomienda proteger la ropa íntima debido a la posibilidad de que se produzca un drenaje vaginal.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Este medicamento no debe ser usado conjuntamente con contraceptivos de barrera (diafragma, preservativo, etc...).

El uso de productos tópicos (de aplicación local), especialmente si es de forma prolongada, puede causar reacciones de sensibilización.

Embarazo y Lactancia

Dado que no existe experiencia de uso durante el embarazo y la lactancia Lomexin no debería ser utilizado durante estos periodos salvo que según criterio médico el beneficio para la paciente justifique los posibles riesgos.

Efectos sobre la capacidad de conducción

Lomexin no ejerce efecto alguno sobre la capacidad para conducir.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Un óvulo de 200 mg al acostarse durante tres días. Los óvulos deben introducirse

profundamente en la vagina.

SOBREDOSIS

Dada la naturaleza del preparado es poco probable que se produzca una intoxicación. Debido a su forma de administración no se han encontrado casos de sobredosis.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

En casos aislados, tras la aplicación intravaginal, se han descrito síntomas de irritación local, sensación de ardor, que son normalmente moderados y transitorios.

La absorción de Fenticonazol es insignificante, por lo tanto se pueden excluir las repercusiones de tipo sistémico en las condiciones de uso sugeridas. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

FECHA DE CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

Lomexin Crema 2%: tubo con 30 g.

Lomexin Ovulos 600 mg: estuche con 1 óvulo.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: Enero 2001



Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km. 13,300
50180 Utebo (Zaragoza)