LOMEXIN Ovulos 600 mg
Fenticonazol (DCI)

COMPOSICION
Por óvulo:
Fenticonazol (DCI) nitrato..... 600 mg
Excipientes: gelatina, glicerina, dióxido de titanio, hidroxietil benzoato sódico, hidroxipropilbenzoato sódico, parafina líquida, parafina sólida blanca, lecitina de soja, c.s.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Estuche con 1 óvulo vaginal de 600 mg, en blister.

ACTIVIDAD
Antimicótico y antibacteriano de uso ginecológico.

TITULAR Y FABRICANTE
TITULAR: Casen Recordati, S.L., Autovía de Logroño, km. 13,300. 50180 Utebo (Zaragoza)
FABRICANTE: RECORDATI S.p.A.
Via Matteo Civitali, 1. 20148 - MILANO Italia

INDICACIONES TERAPEUTICAS
Lomexin óvulos de 600 mg está indicado en candidiasis vulvovaginal.

CONTRAINDICACIONES
Esta especialidad está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad comprobada a los agentes antifúngicos imidazólicos o a cualquiera de los componentes de la especialidad.

PRECAUCIONES
En caso de una vulvitis concomitante o una balanitis candidiásica del cónyuge, así como para evitar la reinfección, se deberá practicar en ambos un tratamiento local adicional con LOMEXIN crema.
En caso de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de organismos resistentes, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.
Se recomienda proteger la ropa íntima debido a la posibilidad de que se produzca un drenaje vaginal.

INTERACCIONES
No se han descrito.

ADVERTENCIAS
Este medicamento no debe ser usado conjuntamente con contraceptivos de barrera (diafragma, preservativo, etc...).
El uso de productos tópicos (de aplicación local), especialmente si es de forma prolongada, puede causar reacciones de sensibilización.
Embarazo y Lactancia
Dado que no existe experiencia de uso durante el embarazo y la lactancia Lomexin no debería ser utilizado durante estos periodos salvo que según criterio médico el beneficio para la paciente justifique los posibles riesgos.
Efectos sobre la capacidad de conducción
Lomexin no ejerce efecto alguno sobre la capacidad para conducir.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION
Un óvulo de 600 mg una sola vez al acostarse. En caso de persistencia de signos y síntomas de vaginitis, puede repetirse otra administración después de tres días. Los óvulos deben introducirse profundamente en la vagina.

SOBREDOSIS
Dada la naturaleza del preparado es poco probable que se produzca una intoxicación. Debido a su forma de administración no se han encontrado casos de sobredosis, No obstante en caso de sospecha de ingestión accidental (niños, etc...) deberá inducirse el vómito o intentar un lavado gástrico.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS
En casos aislados, tras la aplicación intravaginal, se han descrito síntomas de irritación local, sensación de ardor, que son normalmente moderados y transitorios.
La absorción de Fenticonazol es insignificante, por lo tanto se pueden excluir las repercusiones de tipo sistémico en las condiciones de uso sugeridas. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

FECHA DE CADUCIDAD
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES
.
LOMEXIN Crema al 2%: tubo con 30 g.
LOMEXIN Ovulos 200 mg: estuche con 3 óvulos.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: Enero 2001

CASEN RECORDATI GROUP

Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km. 13,300
50180 Utebo (Zaragoza)